

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЗападВетСервис»
А. В. Малашко
«01» февраля 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению добавки коровой «Циамин»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Добавка кормовая «Циамин» является источником цинка и предназначена для обогащения кормов, входящих в рационы поросят.
- 1.2 Кормовая добавка представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета.
- 1.3 В 100,0 г добавки кормовой содержится: не менее 400000 мг/кг цинка (в форме хелата цинка), вспомогательные вещества (лизин, метионин) и наполнитель.
- 1.4 Кормовая добавка не содержит генно - модифицированные продукты и организмы, безвредна, не токсична, совместима со всеми ингредиентами кормов и лекарственными средствами, а также с другими кормовыми добавками.
- 1.5 Добавку кормовую «Циамин» упаковывают в мешки бумажные или полимерные по 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 25,0 и 50,0 кг.
- 1.6 Добавку кормовую хранят в закрытых, вентилируемых, сухих помещениях.
- 1.7 Срок годности 2 (два) года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

2 СВЕДЕНИЯ О КОРМОВОЙ ДОБАВКЕ

- 2.1 Основными компонентом добавки кормовой «Циамин» является хелат цинка. Цинк оказывает вяжущее действие, препятствует всасыванию токсинов и выходу жидкости в просвет кишечника.
- 2.2 Добавка кормовая «Циамин» необходима для нормального формирования костей и роста, для синтеза нуклеотидов, хромопротеидов, способствует интенсивному росту молодняка, интенсивному использованию кормов, влияет на формирование эритроцитов и отложение в костях кальция, участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способствует усвоению фосфора и кальция.
- 2.3 При выращивании поросят добавка кормовая «Циамин» имеет первоочередное значение, так как цинк восполняет дефицит данного продукта у поросят, особенно в послеотъемный период, что резко сокращает смертность и болезненность.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

- 3.1 Добавка кормовая «Циамин» предназначена для реализации, изготовления комбикормовой продукции и обогащения цинком кормов, входящих в рационы поросят, особенно в послеотъемный период.
- 3.2 Добавку кормовую вводят в корма, комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Добавка при приготовлении корма выдерживает все используемые температурные режимы.
- 3.3 Дозы и способ применения добавки кормовой «Циамин».
Добавку кормовую «Циамин» применяют для нормализации обмена веществ, улучшения пищеварения и повышения резистентности организма поросят.
Добавку задают в течение 7 дней в дозе 0,5 -1,0 кг на 1000 кг корма с целью восполнения дефицита цинка и в случаях выявления желудочно- кишечных расстройств у поросят. Для профилактики недостатка цинка добавку задают по 0,25-0,5 кг на 1000 кг корма ежедневно без ограничений.
- 3.3 Добавка в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм поросят. Побочного действия и противопоказаний не выявлено.

3.4 Продукцию животноводства при применении добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы с добавкой необходимо проводить в спецодежде.

4.2. Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

4.3. После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения добавки кормовой, её использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19^а и изготовителю. Одновременно в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» высылают невскрытую упаковку добавки кормовой данной партии с подробным описанием осложнений.

6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

6.1. ООО «ЗападВетСервис»

220035, Республика Беларусь, г. Минск, улица Тимирязева, дом 67, помещение 390.