

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного препарата «Гентафарм 10%»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Гентафарм 10% (Gentafarmum 10%).

Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: гентамицин.

Форма выпуска: порошок для орального применения.

1.2 Препарат представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета легкорастворимый в воде.

1.3 В 1,0 г препарат содержит 100,0 мг гентамицина сульфата и вспомогательное вещество (декстроза моногидрат).

1.4 Препарат упаковывают в пакеты из металлизированной полиэтиленовой пленки по 0,1; 0,5; 1,0; 5,0 кг.

1.5 Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте, при температуре от плюс 5°C до плюс 25°C. Хранить в местах, недоступных для детей.

1.6 Срок годности препарата 2 (два) года от даты изготовления. Не применять по истечению срока годности.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Гентамицина сульфат - антибиотик из группы аминогликозидов, обладает широким спектром антимикробного действия, активен в отношении большинства грамотрицательных (*Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*, *Treponema hyodysenteriae*) и грамположительных микроорганизмов (*Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus spp.*, *Listeria monocytogenes*). Антибиотик не действует на анаэробные бактерии, грибы, вирусы и на простейших.

2.2 Механизм действия гентамицина обусловлен его необратимым связыванием со специфическими рецепторами бактериальных рибосом, что приводит к нарушению считывания информации в системе синтеза белка, ведущее к включению ошибочных аминокислот в пептидную цепь.

2.3 При применении внутрь препарат практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта и оказывает свое действие только в кишечнике в течение 12 ч. При пероральном введении препарат выводится с фекалиями и в незначительных количествах с мочой.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Гентафарм 10% применяют свиньям, телятам и птице при бактериальных желудочно-кишечных болезнях, вызванных чувствительными к антибиотику микроорганизмами.

3.2 Препарат применяют внутрь индивидуально или групповым методом с кормами или водой в течение 3-7 дней в дозах, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Вид животных	Порядок применения препарата и дозы
Телята	В первый день гентафарм 10% применяют в дозе 0,5 г препарата на 10 кг массы тела в два приема с интервалом 12 ч; в последующие 2-4 дня в дозе 0,4 г препарата на 10 кг массы тела один раз в сутки
Поросята	Препарат при колибактериозе выпаивают с водой из расчета 11,0 г препарата на 100,0 л воды в течение 3 дней, при сальмонеллезе - 15,0 г препарата на 100,0 л воды в течение 4 дней, при кампилобактериозе и дизентерии 22,0 г препарата на 100,0 л воды в течение 5 дней. При приеме с кормом препарат задают в дозе 0,25 г на 10 кг массы тела, 2 раза в сутки в течение 3-5 дней.
Птица	Гентафарм 10% выпаивают с водой из расчета 5 г препарата на 100 л воды в течение 5-7 дней.

3.3 Лечебный раствор следует готовить непосредственно в день применения. При применении препарата с кормом рекомендуется применять дробное смешивание. Препарат термостабилен.

3.4 При применении препарата возможны ототоксический и нефротоксический эффекты, аллергия. При возникновении аллергических реакций и других осложнениях применения препарата следует прекратить и назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.

3.5 Не допускается одновременное или последовательное применение гентамицина с другими ото- и нефротоксичными препаратами (стрептомицином, канамицином, неомицином). Запрещается применение препарата при тяжелых нарушениях функции почек.

3.6 Запрещается применение препарата животным с развитыми преджелудками и птице, яйца которых предназначено для пищевых целей.

3.7 Убой животных на мясо разрешается через 10 суток, а птицы через 25 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее указанного срока, используют на корм плотоядным животным.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.



5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «ЗападВетСервис»
Минская обл., г. Жодино, ул. Куприянова, 7А.

Инструкция по применению препарата разработана сотрудниками УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (П.П. Красочко) и ООО «ЗападВетСервис» (С.Н. Федоров).

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
« 21 » 09	2011 г. протокол № 116