



ИНСТРУКЦИЯ по применению добавки кормовой «ТриАсид»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Добавка кормовая ТриАсид предназначена для подкисления воды и кормов, улучшения их санитарно-гигиенических и вкусовых качеств, снижения уровня патогенной микрофлоры и повышения продуктивности свиней и птицы.

1.2 Кормовая добавка представляет собой раствор от бесцветного до светло-желтого цвета.

1.3 Добавка содержит смесь органических кислот (муравьиной, молочной и пропионовой) и воду питьевую до 100%.

Гарантированные показатели: 30,0 % муравьиной кислоты, 30 % пропионовой кислоты, 10,0 % молочной кислоты.

1.4 Кормовая добавка не содержит генно - модифицированные продукты и организмы, в рекомендуемых дозах безвредна, не токсична, совместима со всеми ингредиентами кормов и лекарственными средствами, а также с другими кормовыми добавками.

1.5 ТриАсид упаковывают в упаковку из полимерных материалов (флаконы, канистры, бочки) по 0,5 кг (0,43 л); 1,0 кг (0,87 л); 5,0 кг (4,35 л.); 10,0 кг (8,7 л); 20,0 (17,4 л); 25,0 кг (21,7 л), 250,0 кг (217,0 л) или 1000,0 кг (869,6 л).

1.6 Добавку кормовую хранят в упаковке изготовителя в сухом помещении при температуре от 0°С до плюс 35°С. Хранить в местах не доступных для детей.

1.7 Срок годности 2 (два) года при соблюдении условий хранения.

2 СВЕДЕНИЯ О КОРМОВОЙ ДОБАВКЕ

2.1 Биологические свойства ТриАсид обусловлены входящими в состав добавки смеси органических кислот, которые снижают микробную обсемененность корма, улучшают его санитарно-гигиенические и вкусовые качества.

2.2 Применение добавки с кормом увеличивает его конверсию, снижает уровень заболеваемости, что приводит к повышению продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

2.3 Органические кислоты являются естественными метаболитами обмена веществ в организме животных и птицы, активно участвуют в обеспечении энергией.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

3.1 Добавку кормовую ТриАсид применяют для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах и повышения продуктивности свиней и птицы.

3.2 Добавку кормовую ТриАсид применяют индивидуально или методом группового выпаивания. Добавка хорошо смешивается с водой. В корма (комбикорма) добавку вводят на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

3.3 Нормы ввода и способ применения добавки кормовой ТриАсид:

- птице (курам, индейке) – 0,5 - 2 л на 1000 л питьевой воды или от 1 до 3 л на тонну корма, в зависимости от бактериальной обсемененности корма;

- свиньям - 0,5 - 2 л на 1000 л питьевой воды или от 1 до 3 л в тонну корма, в зависимости от бактериальной обсемененности корма.

3.4 Добавка в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм животных и птицы. Побочного действия и противопоказаний не выявлено.

3.5 Продукцию животноводства и птицеводства при применении добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы с добавкой необходимо проводить в спецодежде. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, респиратор, защитные очки. При попадании добавки в глаза – промыть большим количеством проточной воды; при попадании на кожу - смыть водой с мылом; при вдыхании – вывести на свежий воздух; во всех случаях обратиться к врачу.

4.2. Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

4.3. После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

6.1 ООО «ЗападВетСервис»

222162, Республика Беларусь, г. Жодино, ул. Куприянова, д.7а