



Директор ООО «ЗападВетСервис»
Ж.А. Бабушкина
2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению кормовой добавки «ДуАсид»

1. Торговое наименование кормовой добавки. ДуАсид.

Назначение. Применяют для подкисления воды, снижения уровня патогенной микрофлоры в воде и пищеварительном тракте телят и птицы, формирования в кишечнике благоприятной микрофлоры, улучшения процессов пищеварения и обмена веществ, повышения продуктивности и сохранности животных (птицы).

2. Состав: кислота молочная, кислота муравьиная, вода питьевая.

Содержание и химическое название действующего(их) и вспомогательного(ых) веществ кормовой добавки. В кормовой добавке содержится: 16,0 % кислоты молочной, 8,0 % кислоты муравьиной.

3. Форма выпуска кормовой добавки. Жидкость.

Внешний вид (агрегатное состояние, цвет, запах, гигроскопичность, прозрачность, летучесть). Представляет собой жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

4. Фасовка, упаковка, условия хранения, транспортировки, срок годности кормовой добавки. Добавку упаковывают в тару полимерную по 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 20,0; 25,0; 250,0; 1000,0 кг.

Добавку кормовую хранят в упаковке изготовителя в сухом помещении при температуре от 0°C до плюс 35°C.

Добавку транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта.

Срок годности: 3 (три) года с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Не использовать по истечении срока годности.

5. Основные биологические и другие свойства кормовой добавки.

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в ее состав муравьиной и молочной кислот. Органические кислоты снижают уровень pH в воде для поения и желудочно-кишечном тракте животных, в том числе птицы, способствуют формированию в кишечнике благоприятной микрофлоры, улучшают секрецию и активность ферментов, увеличивают конверсию корма, повышают продуктивность и сохранность сельскохозяйственных животных и птицы, предотвращают образование сгустков казеина в желудке у телят.

Муравьиная кислота – самая сильная алифатическая кислота, обладающая прямым антимикробным действием. Молочная кислота способствует повышению усвоения фосфора и кальция организмом, активизирует выделение пищеварительных ферментов в кишечный тракт и стимулирует их действие.

Молочная и муравьиная кислоты являются естественными метаболитами обмена веществ в организме животных и птицы, активно участвуют в обеспечении энергией.

6. Показания к применению кормовой добавки. Добавку применяют индивидуально или методом группового выпаивания.

Добавка хорошо смешивается с водой.

7. Порядок и способ применения кормовой добавки.

Норма ввода кормовой добавки:

- сельскохозяйственной птице: 3 л на 1000 л воды для поения через систему водоснабжения,
- телятам до 10-дневного возраста: 10-15 мл на 1 л молока или по 5-10 мл на 1 л молозива при каждом кормлении.

Период выпаивания, выбор конкретной дозировки определяется качеством воды, рекомендациями ветеринарного специалиста при профилактике или лечении различных патологий.

Приготовленный раствор пригоден для выпаивания в течение 24 часов.

8. Возможные побочные явления и осложнения, в том числе при передозировке. Меры предупреждения и лечения (антидоты, дезактивация, нейтрализация).

Добавка в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм животных и птицы. Побочного действия и противопоказаний не выявлено.

9. Совместимость с другими кормовыми добавками и ветеринарными препаратами, подтвержденная исследованиями (испытаниями).

Исследования не проводились.

10. Противопоказания для применения кормовой добавки.

При соблюдении инструкции по применению противопоказания отсутствуют.

11. Сроки возможного использования продуктов животного происхождения после применения кормовой добавки.

Продукцию животноводства и птицеводства при применении добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений.

12. Соблюдение предосторожности, правил личной гигиены, использование средств защиты при работе с кормовыми добавками. Оказание первой помощи пострадавшим и рекомендуемые антидоты (при необходимости).

Все работы с добавкой необходимо проводить в спецодежде. При попадании добавки в глаза – промыть большим количеством проточной воды; при попадании на кожу – смыть водой с мылом; при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. Во всех случаях обратиться к врачу.

Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

13. Производитель кормовой добавки.

ООО «ЗападВетСервис», 222162, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А, тел./факс +375177553559, почта: zapadvets@gmail.com.

Адрес производственной площадки: Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А.

14. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

ООО «ЗападВетСервис», 222162, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А.

15. Порядок предъявления рекламаций.

В случае возникновения осложнений после применения кормовой добавки, ее использование прекращают, потребитель сообщает об этом производителю и в территориальную ветеринарную службу.

При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животных потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией, отбираются пробы кормовой добавки в необходимом количестве. Составляется акт отбора проб и пробы направляются в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, д. 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

Регистрационный номер кормовой добавки: 16-2092-170723.