

ИНСТРУКЦИЯ по применению кормовой добавки «ФайвАсид»

1. Торговое наименование кормовой добавки. ФайвАсид.

Назначение. Предназначена для мягкого подкисления питьевой воды и улучшения работы системы пищеварения, а также обмена веществ (включая белковый, минеральный и энергетический обменные процессы) у сельскохозяйственных животных и птицы.

2. Состав: кислота муравьиная, кислота пропионовая, кислота молочная, кислота лимонная, кислота сорбиновая, хелатный комплекс цинка и меди (Cu-Zn-ЭДТА), натрия хлорид, вода питьевая.

Содержание и химическое название действующего(их) и вспомогательного(ых) веществ кормовой добавки. В кормовой добавке содержится: кислота муравьиная (50,0 %), кислота пропионовая (15,0 %), кислота молочная (5,0 %), кислота лимонная (1,7 %), кислота сорбиновая (0,9 %), хелатный комплекс цинка и меди (цинк (0,045 %), медь (0,045 %)).

3. Форма выпуска кормовой добавки. Жидкость.

Внешний вид (агрегатное состояние, цвет, запах, гигроскопичность, прозрачность, летучесть). Жидкость от голубого до темно-синего цвета.

4. Фасовка, упаковка, условия хранения, транспортировки, срок годности кормовой добавки. Добавку упаковывают в тару полимерную по 0,5; 1,0; 10,0; 20,0; 25,0; 250,0; 1000,0 кг.

Добавку кормовую хранят в упаковке изготовителя в сухом помещении при температуре от плюс 0⁰С до плюс 35⁰С.

Добавку транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта.

Срок годности: 3 (три) года с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Не использовать по истечении срока годности.

5. Основные биологические и другие свойства кормовой добавки.

Биологические свойства обусловлены входящими в его состав компонентами. Органические кислоты снижают уровень pH в воде для поения и желудочно-кишечном тракте животных, улучшают секрецию и активность ферментов, способствующих перевариванию корма.

Сбалансированный комплекс органических кислот избирательно ингибируют рост патогенных микроорганизмов (*E. Coli*, *Salmonella sp.*, *Campylobacter*, *Listeria*), а также плесневых грибов и дрожжей, способствует формированию в кишечнике благоприятной молочнокислой микрофлоры (*Bifidobacterium sp.*, *Lactobacillus sp.*). Молочная кислота способствует повышению усвоения фосфора и кальция организмом, активизирует выделение пищеварительных ферментов в кишечный тракт и стимулирует их действие. Цинк и медь участвуют в ряде ферментативных реакций, необходимы для синтеза белков и ферментов.

Добавка кормовая улучшает микробиологические показатели воды для поения, обеспечивает мягкое подкисление и улучшает её вкусовые качества, поддерживает чистоту линий поения, снижает риск желудочно-кишечных заболеваний, улучшает конверсию корма, увеличивает продуктивность и сохранность поголовья.

6. Показания к применению кормовой добавки. Регулярное применение добавки улучшает санитарно-гигиенические и вкусовые показатели воды, профилактирует образование минеральных депозитов в системе поения, способствует снижению патогенной микрофлоры в питьевой воде и пищеварительном тракте сельскохозяйственных животных (птицы), улучшает процессы пищеварения и обмена веществ, повышает конверсию корма, продуктивность и сохранность поголовья.

7. Порядок и способ применения кормовой добавки.

Применяют индивидуально или методом группового выпаивания.

Добавка хорошо смешивается с водой.

Норма ввода кормовой добавки:

- пороссятам сосунам и отъемышам: 0,2-0,3 л на 1000 л воды для ежедневного выпаивания, норму ввода увеличивают до 0,5 л на 1000 л воды в период стрессовых ситуаций (смена рациона, кастрация, перегруппировка и др.) за 3-5 дней до и после проведенных мероприятий;
- свиньям, пороссятам на откорме: 0,3-0,5 л на 1000 л воды для поения, рекомендуется вводить в рацион в период перегруппировки или смены рациона для снижения постстрессовых реакций;
- супоросным свиноматкам: 0,3-0,5 л на 1000 л воды вводят в рацион за месяц до опороса;
- сельскохозяйственной птице: 0,2-0,5 л на 1000 л воды для поения через систему водоснабжения (для поддержания оптимального pH воды, норма ввода зависит от жесткости воды);
- телятам молочного периода: 0,2-0,5 мл на 1 л воды для поения, молока или молозива. При разведении в молоке - перемешивают до образования гомогенной массы и выпаивают через 2-3 часа.

Приготовленный раствор пригоден для выпаивания в течение 24 часов.

Период выпаивания, выбор конкретной дозировки определяется качеством воды, рекомендациями ветеринарного специалиста.

Выпойку добавки необходимо прекратить за 24 часа до применения вакцин.

8. Возможные побочные явления и осложнения, в том числе при передозировке. Меры предупреждения и лечения (антидоты, дезактивация, нейтрализация). Добавка в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм свиней. Побочного действия и противопоказаний не выявлено.

9. Совместимость с другими кормовыми добавками и ветеринарными препаратами, подтвержденная исследованиями (испытаниями). Исследования не проводились.

10. Противопоказания для применения кормовой добавки. При соблюдении инструкции по применению противопоказания отсутствуют.

11. Сроки возможного использования продуктов животного происхождения после применения кормовой добавки. Продукцию животноводства при применении добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений.

12. Соблюдение предосторожности, правил личной гигиены, использование средств защиты при работе с кормовыми добавками. Оказание первой помощи пострадавшим и рекомендуемые антидоты (при необходимости). Все работы с добавкой необходимо проводить в спецодежде. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, респиратор, защитные очки. При попадании добавки в глаза – промыть большим количеством проточной воды; при попадании на кожу – смыть водой с мылом; при вдыхании – вывести на свежий воздух; во всех случаях обратиться к врачу.

Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

13. Производитель кормовой добавки. ООО «ЗападВетСервис», 222162, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А, тел./факс +375177553559, почта: zapadvets@gmail.com.

Адрес производственной площадки: Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А.

14. Организация, уполномоченная на принятие претензий. ООО «ЗападВетСервис», 222162, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А.

15. Порядок предъявления рекламаций.

В случае возникновения осложнений после применения кормовой добавки, ее использование прекращают, потребитель сообщает об этом производителю и в территориальную ветеринарную службу.

При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животных потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией, отбираются пробы кормовой добавки в необходимом количестве. Составляется акт отбора проб и пробы направляются в государственное учреждение «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» (220005, г. Минск, ул. Красная, д. 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

Регистрационный номер кормовой добавки: 16-2091-170723.