

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЗападВетСервис»

Ж.А. Бабушкина

« 02 » 09 2026 г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению кормовой добавки «ТриАсид»

1. Торговое наименование кормовой добавки. ТриАсид.

Назначение. Применяют для подкисления воды и кормов, улучшения их санитарно-гигиенических и вкусовых качеств, снижения уровня патогенной микрофлоры и повышения продуктивности свиней и птицы.

2. Состав: кислота муравьиная, кислота пропионовая, кислота молочная, вода питьевая.

Содержание и химическое название действующего(их) и вспомогательного(ых) веществ кормовой добавки. В кормовой добавке содержится: 30,0 % кислоты муравьиной, 30,0 % кислоты пропионовой, 10,0 % кислоты молочной.

3. Форма выпуска кормовой добавки. Жидкость.

Внешний вид (агрегатное состояние, цвет, запах, гигроскопичность, прозрачность, летучесть). Представляет собой жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

4. Фасовка, упаковка, условия хранения, транспортировки, срок годности кормовой добавки. Добавку упаковывают в тару полимерную по 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 20,0; 25,0; 250,0; 1000,0 кг.

Добавку кормовую хранят в упаковке изготовителя в сухом помещении при температуре от 0°C до плюс 35°C.

Добавку транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта.

Срок годности: 2 (два) года с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Не использовать по истечении срока годности.

5. Основные биологические и другие свойства кормовой добавки.

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в ее состав смеси органических кислот, которые снижают уровень pH в кормах и воде для поения, микробную обсемененность корма, улучшают их санитарно-гигиенические и вкусовые качества.

Применение добавки с кормом увеличивает его конверсию, снижает уровень заболеваемости, что приводит к повышению продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

Органические кислоты являются естественными метаболитами обмена веществ в организме животных и птицы, активно участвуют в обеспечении энергией.

6. Показания к применению кормовой добавки. Добавку применяют индивидуально или методом группового выпаивания. Добавка хорошо смешивается с водой. В корма (комбикорма) добавку вводят на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

7. Порядок и способ применения кормовой добавки.

Норма ввода кормовой добавки:

- птице (курам, индейке): 0,5-2 л на 1000 л питьевой воды или от 1 до 3 л на тонну корма, в зависимости от бактериальной обсемененности корма;

- свиньям: 0,5-2 л на 1000 л питьевой воды или от 1 до 3 л в тонну корма, в зависимости от бактериальной обсемененности корма.

8. Возможные побочные явления и осложнения, в том числе при передозировке. Меры предупреждения и лечения (антидоты, дезактивация, нейтрализация).

Добавка в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм животных и птицы. Побочного действия и противопоказаний не выявлено.

9. Совместимость с другими кормовыми добавками и ветеринарными препаратами, подтвержденная исследованиями (испытаниями).

Исследования не проводились.

10. Противопоказания для применения кормовой добавки.

При соблюдении инструкции по применению противопоказания отсутствуют.

11. Сроки возможного использования продуктов животного происхождения после применения кормовой добавки.

Продукцию животноводства и птицеводства при применении добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений.

12. Соблюдение предосторожности, правил личной гигиены, использование средств защиты при работе с кормовыми добавками. Оказание первой помощи пострадавшим и рекомендуемые антидоты (при необходимости).

Все работы с добавкой необходимо проводить в спецодежде. При попадании добавки в глаза – промыть большим количеством проточной воды; при попадании на кожу – смыть водой с мылом; при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. Во всех случаях обратиться к врачу.

Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

13. Производитель кормовой добавки.

ООО «ЗападВетСервис», 222162, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А, тел./факс +375177553559, почта: zapadvets@gmail.com.

Адрес производственной площадки: Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А.

14. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

ООО «ЗападВетСервис», 222162, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А.

15. Порядок предъявления рекламаций.

В случае возникновения осложнений после применения кормовой добавки, ее использование прекращают, потребитель сообщает об этом производителю и в территориальную ветеринарную службу.

При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животных потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией, отбираются пробы кормовой добавки в необходимом количестве. Составляется акт отбора проб и пробы направляются в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, д. 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

Регистрационный номер кормовой добавки: 16-2093-170723.