

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЗападВетСервис»
А. Бабушкина
« 22 » 09 / 2026 г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению кормовой добавки «ЗВС Милк Соу»

1. Торговое наименование кормовой добавки. ЗВС Милк Соу.

Назначение. Применяют для восполнения лизина и метионина в рационе свиноматок до и после опороса, нормализации обмена веществ, улучшения пищеварения и повышения молокоотдачи.

2. Состав: метионин, лизин, декстроза.

Содержание и химическое название действующего(их) и вспомогательного(ых) веществ кормовой добавки. В кормовой добавке содержится: 2,0 % метионина, 0,5 % лизина.

3. Форма выпуска кормовой добавки. Порошок.

Внешний вид (агрегатное состояние, цвет, запах, гигроскопичность, прозрачность, летучесть). Представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета, без затхлого и плесневого запахов.

4. Фасовка, упаковка, условия хранения, транспортировки, срок годности кормовой добавки. Добавку упаковывают в мешки полимерные или бумажные с полимерным вкладышем по 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0 кг.

Добавку кормовую хранят в закрытых, вентилируемых, сухих помещениях при температуре от плюс 5⁰С до плюс 25⁰С.

Добавку транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта.

Срок годности: 1 (один) год с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Не использовать по истечении срока годности.

5. Основные биологические и другие свойства кормовой добавки.

Биологические свойства добавки обусловлены действием комплекса незаменимых аминокислот.

Лизин – это незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых белков, необходима для роста, восстановления тканей, производства антител, гормонов, ферментов, альбуминов. Лизин понижает уровень триглицеридов в сыворотке крови. Дефицит лизина неблагоприятно сказывается на синтезе белка, что приводит к замедлению роста и снижению массы тела, анемии и проблемам в репродуктивной сфере.

Метионин – алифатическая серосодержащая α-аминокислота, входит в число незаменимых аминокислот, ускоряет регенерацию повреждённых тканей, активизирует ферменты и половые гормоны, обменные процессы кальция, нормализует функцию печени, стимулирует липидный обмен, связывает и выводит из организма токсины, молекулы тяжелых металлов (свинец, кадмий, ртуть), улучшает пищеварение.

Скармливание добавки свиноматкам до и после опороса обеспечивает облегчение течения опороса, за счет улучшения пищеварения и эффективного освобождения кишечника от содержимого перед опоросом, а также после опороса стимулирует максимальную молокоотдачу и профилактирует возникновение симптомокомплекса ММА.

6. Показания к применению кормовой добавки. Применяют для восполнения лизина и метионина в рационе свиноматок до и после опороса, нормализации обмена веществ, улучшения пищеварения и повышения молокоотдачи.

7. Порядок и способ применения кормовой добавки.

Добавку применяют из расчета 100 г на одну свиноматку в сутки в смеси с основным кормом в течение 5-10 дней. Начинать скармливать необходимо за 3-4 дня до опороса.

Добавку вводят в корма, комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Добавка при приготовлении корма выдерживает все используемые температурные режимы.

8. Возможные побочные явления и осложнения, в том числе при передозировке. Меры предупреждения и лечения (антидоты, дезактивация, нейтрализация).

Добавка в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм свиней. Побочного действия и противопоказаний не выявлено.

9. Совместимость с другими кормовыми добавками и ветеринарными препаратами, подтвержденная исследованиями (испытаниями).

Исследования не проводились.

10. Противопоказания для применения кормовой добавки.

При соблюдении инструкции по применению противопоказания отсутствуют.

11. Сроки возможного использования продуктов животного происхождения после применения кормовой добавки.

Продукцию животноводства при применении добавки кормовой можно использовать в пищевых целях без ограничений.

12. Соблюдение предосторожности, правил личной гигиены, использование средств защиты при работе с кормовыми добавками. Оказание первой помощи пострадавшим и рекомендуемые антидоты (при необходимости).

Все работы с добавкой необходимо проводить в спецодежде.

Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

13. Производитель кормовой добавки.

ООО «ЗападВетСервис», 222162, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А, тел./факс +375177553559, почта: zapadvets@gmail.com.

Адрес производственной площадки: Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А.

14. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

ООО «ЗападВетСервис», 222162, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Куприянова, д. 7А.

15. Порядок предъявления рекламаций.

В случае возникновения осложнений после применения кормовой добавки, ее использование прекращают, потребитель сообщает об этом производителю и в территориальную ветеринарную службу.

При подтверждении выявления отрицательного воздействия кормовой добавки на организм животных потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения проводится изучение соблюдения всех правил по применению кормовой добавки в соответствии с инструкцией, отбираются пробы кормовой добавки в необходимом количестве. Составляется акт отбора проб и пробы направляются в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, д. 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

Регистрационный номер кормовой добавки: 18-2183-261223.